



Северный олень (*Rangifer tarandus*)

- ★ **Приметы:** вытянутое приземистое тело (длина 180-220 см, высота в холке 100-140 см). На шее короткая, не всегда заметная грива, морда удлиненная. Окраска летом бурая, зимой серая. Грива зимой белая. Рога есть у самцов и самок. Они очень длинные, тонкие, серповидно изогнутые.



- ★ Обитает в равнинах и горных тундрах, где придерживаются верховых болот, пустоши и боров с зарослями ягеля. Во время миграции олени десятилетиями следуют по одним и тем же маршрутам, переплывая реки и морские проливы в определенных местах. Домашние стада не так широко кочуют как дикие, и местами полностью уничтожают растительный покров тундры.
- ★ Кроме наземных и древесных лишайников, он питается также травой, листьями, грибами и ягодами, при случае может поедать яйца птиц. Зимой ему приходится раскапывать снег на глубину до 80 см в поисках корма. Лишайники бедны минеральными солями, поэтому очень часто он пьет морскую воду.



Белый медведь (*Ursus maritimus*)

Занесен в Красную книгу России.

★ **Приметы:** Крупнейший из числа хищников мировой фауны (длина тела до 3 м), ведущий полуводный образ жизни. Окраска белая или желтоватая. Нос и лоб в профиль вытянуты в одну линию. Голова небольшая, на длинной подвижной шее, уши маленькие, округлые.




- ★ Редкий вид, встречающийся вдоль побережья Баренцева моря. Частые встречи обычно в марте – апреле, когда становится прочный лед, и животные двигаются вдоль берега в поисках корма. Обитает на плавучих льдах и побережьях Арктики, где совершает очень далекие кочевки. Летом белые медведи и сами забредают в тундру. В берлоги ложатся только беременные медведицы, обычно в надувах снега под обрывистыми берегами островов.
- ★ Питается в основном морскими млекопитающими, прежде всего нерпами, тюленями. При случае ест моржей, белух, северных оленей, леммингов, рыбу, морских птиц, летом – ягоды, водоросли и другой растительный корм.



Белый песец (*Alopex lagopus*)

★ **Признаки:** среднего размера
приземистый зверь с очень
пушистым длинным хвостом и
маленькими квадратными
ушами. Морда короткая, слабо
заостренная. Летом их мех
короткий, темно-бурый. Зимой
большинство зверей чисто-белые.



- ★ Обитает по всей территории тундровой зоны, а так же на островах Арктики. Зимой большая часть зверей откочевывает в лесотундру, изредка забегая далеко на юг; некоторые кочуют по льдам Арктики, следуя за белыми медведями и питаясь остатками их добычи. На период размножения роет сложные норы, обычно на сухих возвышенных местах, первыми освобождающихся от снега.
- ★ Питается в основном грызунами, а так же падалью, птицами, отбросами, ягодами. Отлично плавает. Летом почти не боится человека, активен днем. Зимой очень осторожен и ведет ночной образ жизни.



Бурый медведь (*Ursus arctos*)

★ **Признаки:** Крупное, лохматое, неуклюжего сложения, с большой головой, небольшими ушами и коротким хвостом животное. Длина тела достигает 2 м. окраска бурая, реже черная или рыжеватая, изредка есть светлое пятно на груди.



- ★ Обитает по всей лесной зоне. Летом часто заходит в тундру. Активен чаще в сумерках и ночью, но иногда так же и днем. Зимой бурый медведь впадает в неглубокий сон, устроив берлогу под корнями деревьев, в нише обрыва, яме, пещере, неглубокой норе или другом укромном месте, где скапливается много снега. обычно избегает встреч с человеком.
- ★ Питается различными растительными кормами, личинками насекомых, муравьями, при случае грызунами и их запасами. Изредка нападают на копытных.



Волк обыкновенный (*Canis vulpes*)

- ★ **Признаки:** крупный зверь с пушистым хвостом. Длина тела от 1 до 2 м. имеют почти белую окраску, с серым и рыжеватым оттенками.



- ★ Распространен повсеместно. Размножаются в логовах и неглубоких норах, остальное время кочуют по одиночке и семейными группами – стаями. Связь между соседними семьями и членами стаи поддерживаются с помощью воя, который может содержать различную информацию.
- ★ Питается копытными, грызунами, реже всевозможной дичью от насекомых до спящих в берлогах медведей, растительными кормами. Основная добыча зимой – северный олень.



Лисица обыкновенная (*Vulpes vulpes*)

- ★ **Признаки:** среднего размера звери с длинным, очень пушистым хвостом и большими острыми ушами. Грудь белая. Длина тела около метра. задняя сторона ушей черная, кончик хвоста белый, на лапах черные пятна. Окраска рыжая, часто с темным крестом на плечах.



- ★ Питается грызунами, реже зайцами, птицами, насекомыми, ягодами. Свою основную добычу – грызунов – лиса ловко выкапывает из под снега на слух.
- ★ Охотится круглые сутки, но чаще в сумерки обычно охотятся рядом со своим логовом.
- ★ Лисица – важнейший объект охоты и клеточного разведения.



Росомаха (*Gulo gulo*)

★ **Признаки:** крупный зверь (длина тела около метра), несколько похожий на **маленького пушистого остроногого медведя с небольшой головой, небольшими ушами и лохматым хвостом. Окраска от буровато-серой или рыжевато-коричневой до черной, вдоль боков тянется широкая рыжеватая, белая или желтая полоса, еще одна светлая полоска обычно бывает поперек лба.**



- ★ Распространена по всей зоне лесотундры. Летом забредает в тундру до самого арктического побережья, зимой – в смешанные леса. Благодаря широким лапам, росомаха не проваливается в снег, и может кочевать на большие расстояния по глубокому снегу. Обычно нор не роет, разве что в снегу, используют различные укрытия и чужие норы. Лишь во время размножения самка роет берлогу в снегу.
- ★ В бесснежный период питается в основном молодыми копытными, мелкими животными, личинками насекомых, растительными кормами, легко взбираясь за ними на деревья. Зимой охотится на копытных, зайцев, кормится падалью и мышевидными грызунами, часто следует за стаями волков, куниц, лисой, отнимая добычу или подбирая остатки.



Лось (*Alces alces*)

- ★ **Признаки:** самый крупный из оленей. Его легко узнать по **длинным мощным ногам, горбоносой морде; у стоящего зверя холка намного выше крупа. Под горлом обычно свешивается кожный вырост – серьга. Окраска буро-черная, ноги светлые.**



- ★ Населяют леса, по берегам озер, поймы рек в лесостепи. Летом выходят в тундры на сотни километров от леса. В бесснежное время лось чаще всего можно увидеть на зарастающих вырубках и гарях, болотах, по берегам лесных рек и озер, зимой в лесах с густым подлеском. Активен в любое время суток, но чаще всего пасется перед рассветом и после захода солнца.
- ★ Питается листьями деревьев и кустарников, а так же травой, грибами и ягодами; зимой переходит на веточный корм не обеспечивает его достаточным количеством энергии. В жаркое время лось не редко забирается по шею в озеро или тихую реку, где спасается от гнуса и поедает сочную водную растительность.



Заяц-беляк (*Lepus timidus*)

★ **Признаки:** Хвост маленький, но все же хорошо виден. Задние ноги намного длиннее передних и при движении выносятся далеко вперед. Окраска буроватая или серая летом и чисто-белая зимой. Активны в основном в сумерки и ночью.



- ★ Обитает повсюду, в тундрах, лесах, березовых колках, пойменных ивняках, на зарастающих вырубках и гарях. Для кормежки часто выходит на поля, но лежка бывает только под защитой деревьев и кустов.
- ★ Зайчата рождаются зрячими, с густым мехом и первое время сидят в траве неподвижно, чтобы не оставлять следов, а мать приходит их кормить один-два раза по ночам. При этом она кормит не только своих зайчат, но и чужих. Поздней осенью зайчата прячутся в стога сена, чтобы защититься от холода. Но брать найденного зайчонка домой не стоит: зайчихе обычно удается его вырастить, а людям вряд ли.



Ондатра (*Ondatra zibethika*)

★ **Признаки:** околотоводное животное, длина тела около 40 см. уши едва выступают из меха, хвост почти голый, сильно сплюснут с боков, на задних лапах плавательные перепонки. Окраска от светло-рыжей до почти черной.



- ★ Обитает по берегам водоемов, большую часть времени проводит в воде и под водой. Хорошо приживается в солоноватой воде, но исчезает в чистых северных озерах со слабо минерализованной водой. Живет в норах с подводным входом. Там, где нет твердых берегов, ондатра строит хатки из травы и веток. Активна в основном в сумерках.
- ★ Питается прибрежными и водными растениями, а так же моллюсками, лягушками, изредка мелкой рыбой.
- ★ Разводится в неволе ради шкурки.



Атлантический морж (*Odobenus rosmarus*)

★ **Признаки:** очень массивный зверь (достигает 5 метров). Взрослых легко узнать по бивням – удлиненным верхним клыкам. Молодых моржат можно узнать по густой щетке из коротких жестких усов, тупой, как бы обрубленной морде и складчатой коже. Ушных раковин нет. Взрослые особи светлые, рыжевато-коричневые, на солнце становятся розовыми.



- ★ Обитает в арктических и Беринговом морях, где придерживается мелководных участков. Зимой держатся по окраинам плавучих льдов. Весной и летом образует групповые залежки на льду, в конце лета и местами зимой – береговые лежбища. При сильном испуге моржи могут покинуть лежбища на несколько лет или навсегда.
- ★ Питается моллюсками и другими беспозвоночными, которых добывает с глубины 30-50 м, вспахивая донный ил бивнями.



Кольчатая нерпа (*Phoca hispida*)

★ **Признаки:** длина 1-1,5 м. Окраска сверху серая или черная с густым рисунком из мелких белых колец, снизу светлая.



- ★ Обычный обитатель акватории прибрежных вод Печорского моря. Зимой держится на льдах, где иногда, если лед покрыт глубоким снегом, живет в незаметной снаружи подснежной норе, с выходом под лед. В апреле-мае выходит на щенку на лед. в Арктике встречается почти до полюса. Летом держится на мелководьях, изредка образует небольшие залежки на галечных косах.
- ★ Пится рыбой, ракообразными
- ★ Является основным звеном в пищевой цепи, для белого медведя.



Лактак (*Erignatus barbatus*)

- ★ **Признаки:** крупный тюлень (около 2,5 м) однотонной окраски, сверху буро-серой, снизу светло-серой, обычно с размытыми желтоватыми пятнами на голове, спине и брюхе. Усы очень пышные и длинные. Морда чуть вытянутая.



- ★ Распространен во всех арктических морях, обитает в прибрежных зонах, за глубины 70-80 м., заплывает очень редко. Осенью образует береговые лежбища, затем переходит на плавающий лед, где встречается поодиночке или по 2-3 зверя на одной льдине.
- ★ Питается донными животными – крабами, креветками, червями, моллюсками, реже рыбой.